



Algoritmo do **PÉ** em DIABETES





Diretoria SBD - Gestão 2026-2027

Presidente

Dr. João Eduardo Nunes Salles (SP)

Vice-Presidente

Dr. André Gustavo Daher Vianna (PR)

Vice-Presidente

Dra. Karla Melo (PB)

Vice-Presidente

Dr. Rodrigo Moreira (RJ)

Vice-Presidente

Dr. Rodrigo Nunes Lamounier (BH)

Vice-Presidente

Dr. Victor Gervásio e Silva (GO)

1º Tesoureiro

Dra. Patrícia Medici Dualib (SP)

2º Tesoureira

Dra. Lúcia Helena de Oliveira
Cordeiro (PE)

1º Secretário

Dr. Marcio Krakauer (SP)

2º Secretário

Maria Gabriela Secco Cavicchioli (SP)

Conselho Fiscal

Dr. Joaquim Custódio da Silva
Junior (BA)

Conselho Fiscal

Dra. Jacqueline Rizzolli (RS)

Conselho Fiscal

José Vanilton de Almeida (SP)

Suplente

Dra. Marília Gabriela Zanier
Gomes (GO)

Assessoria Presidência Científico

Dr. João Roberto Sá (SP)

Assessoria Presidência - Assuntos

Governamentais

Dra. Karla Melo (PB)

Assessoria Presidência - Assuntos

Internacionais

Dra. Hermelinda Pedrosa (DF)


Assessoria Presidência - Comunicação

Dr. André Gustavo Daher Vianna (PR)

Assessoria Presidência - Educação

Médica Continuada

Dr. Luis Eduardo Calliari (SP)



Algoritmo do PÉ em DIABETES

Autoras:

**Geísa Maria Campos de Macedo, Nilce Botto Dompieri e
Maria do Livramento Saraiva Lucoveis**

**3ª Edição
2026**

SUMÁRIO

1. ALGORITMO PARA ABORDAGEM DAS COMPLICAÇÕES NOS PÉS EM PESSOAS COM DIABETES	7
2. CLASSIFICAR O PÉ DE RISCO DE ULCERAÇÃO	8
3. COMO AVALIAR O RISCO DE ULCERAÇÃO NOS PÉS EM PESSOAS COM DIABETES	10
4. ORIENTAÇÕES PARA O AUTOCUIDADO COM OS PÉS	13
5. LESÕES PRÉ-ULCERATIVAS	16
6. DESCARGA (OFFLOADING) PERMANENTE	20
7. DESCARGA (OFFLOADING) TEMPORÁRIA	21





1. ALGORITMO PARA ABORDAGEM DAS COMPLICAÇÕES NOS PÉS DE PESSOAS COM DIABETES

Este algoritmo tem como propósito facilitar a identificação e o atendimento das complicações nos pés de pessoas com diabetes, na atenção primária do Brasil. O objetivo é evitar a inércia terapêutica, detectar precocemente as alterações neurológicas, vasculares e infecciosas, e estratificar e classificar o risco de ulceração nos pés.


Atuar na prevenção, tratar o que for possível e encaminhar quando necessário, com a maior brevidade, para melhorar os resultados, a qualidade de vida e diminuir as amputações.





ALGORITMO DO

CLASSIFICAR O PÉ DE



Referências bibliográficas.

Infocards. D. Foot. Como Manejar as Pessoas em Risco de Ulceração de Pé (UPD*) Tradução brasileira, 2021 Practical Guidelines on the prevention and management of foot disease related to diabetes. IWGDF, 2023



PÉ EM DIABETES

RISCO DE ULCERAÇÃO

Risco 2 – Moderado

PSP + DAP

PSP + Deformidades
nos pés

DAP + Deformidades
nos pés



Reavaliação
entre 3 a 6 meses

Risco 3 – Alto Risco

PSP e/ou DAP

DRT (Doença Renal
Terminal)

História de úlcera
ou amputação



Reavaliação
entre 1 a 3 meses



- ✓ Orientação para autocuidado com os pés
- ✓ Identificar e tratar lesões pré ulcerativas
- ✓ Orientação sobre calçados para pés neuropáticos (pés insensíveis) com ou sem deformidades
- ✓ No risco 2 orientar exercícios apropriados para pés e tornozelos
- ✓ Considerar acompanhamento conjunto com especialidades: vascular, ortopedista, fisiatra, nefrologista



COMO AVALIAR O RISCO DE ULCERAÇÃO NOS PÉS EM PESSOAS COM DIABETES


Ausência de sintomas não exclui a presença de neuropatia. Pode existir neuropatia assintomática, DAP (doença arterial periférica), sinais pré-ulcerativos ou mesmo uma úlcera. Portanto, avalie os pés de pessoas com diabetes para estratificar o risco de ulceração.



1 - AVALIAÇÃO DA SENSIBILIDADE PROTETORA DO PÉ

Para avaliar perda de sensibilidade protetora (PSP), utilize um dos testes abaixo, sendo o monofilamento o padrão ouro.

- 1 Monofilamento de 10g Semmes-Weinstein.
- 2 Se teste com monofilamento de 10g for inconclusivo, testar com diapasão de 128Hz.
- 3 Na falta do monofilamento e diapasão, fazer o teste do toque leve (ipswitch touch test) usando o dedo indicador por um a dois segundos (fig 3).



HÁLUX



3º DEDO





5º DEDO



2 - AVALIAÇÃO DAS ALTERAÇÕES FUNCIONAIS E DEFORMIDADES

- Pé cavo (alteração nos arcos plantares).
- Proeminência das cabeças dos metatarsos.
- Dedos em garra, em martelo, ou sobrepostos.
- Atrofia da musculatura intrínseca, evidenciada por tendões aparentes.
- Limitação de mobilidade articular (LMA.).



3- AVALIAÇÃO DO ESTADO VASCULAR, PARA RASTREAR ISQUEMIA EM MEMBROS INFERIORES.

- Palpação dos pulsos tibiais anteriores e posteriores.
- Hiperemia reativa; palidez à elevação do membro e rubor à pendência.
- Teste de perfusão por dígito-pressão.

Investigue: claudicação intermitente, pés frios, dor em repouso, ausência ou rarefação de pelos nas pernas, unhas distróficas e involutas.

Caso o serviço disponha de doppler vascular portátil realize ITB (Índice tornozelo – braço) para complementar o rastreamento.



PULSO PEDIOSO



PULSO TIBIAL POSTERIOR



4- AVALIAÇÃO DERMATOLÓGICA

- Identificar lesões pré ulcerativas: Calos, calos com hematoma, fissuras e rachaduras, micoses interdigitais e onicomicoses, unhas encravadas e bolhas.



5- INVESTIGAR

- História de úlcera ou presença de úlcera ativa.
- História de amputação menor ou maior.
- Doença renal em estágio terminal (DRET).



Referência bibliográfica.

Practical Guidelines on the prevention and management of foot disease related to diabetes. IWGDF, 2023.



ORIENTAÇÕES PARA O AUTOCUIDADO COM OS PÉS

Profissionais de saúde deverão avaliar a capacidade das pessoas com diabetes em conduzir adequadamente a vigilância e os cuidados com seus pés: verificar acuidade visual, obesidade, limitações motoras, habilidades para inspecionar a planta dos pés, cortar as unhas e realizar os cuidados de higiene. Se necessário, envolver familiares e rede de apoio, para garantir que os cuidados abaixo sejam executados.

CUIDADOS DE HIGIENE

- Lavar os pés diariamente com água morna e sabonete líquido.
- Escovar as unhas com escovas de cerdas macias.
- Secar muito bem os pés, principalmente entre os dedos.
- Não verificar a temperatura da água do banho com os pés, nem com as mãos, mas usar os cotovelos.



CUIDADOS COM A PELE

- Realizar esfoliação com creme, máscara esfoliante ou bucha vegetal, massageando os pés com movimentos circulares.
- Aplicar hidratante diariamente nas pernas e pés evitando a área entre os dedos.
- Para fissuras profundas, após hidratação, envolver os pés com filme plástico, por 20 a 30 minutos, para aumentar absorção.
- Evitar andar descalço ou usar chinelos com calcanhar exposto.
- Evitar o uso de fitas adesivas (esparadrapos, fitas microporosas, ou curativos adesivos) sobre a pele, pois podem causar lesões ao serem removidos.





--- CALÇADOS E MEIAS

- Usar calçados acompanhados de meias, preferencialmente de algodão, na cor branca ou clara, sem costuras e sem punho e que sejam trocadas diariamente.
- Antes de usar os calçados verificar dentro se não há objetos estranhos.
- Após o uso, higienizar e deixe secar.
- Em caso de micoses, utilizar desinfetante para calçados e palmilhas e alternar o uso dos calçados.
- Para pessoas com deformidades ósseas, pontos elevados de pressão, ou amputações, é recomendável o uso de palmilhas e calçados terapêuticos ou personalizados.



--- CUIDADOS COM AS UNHAS

- Cortar as unhas em ângulo reto, sem remover os cantos, acompanhando formato anatômico.
- Se não for possível, lixar com delicadeza.
- Não remover cutículas, amoleça com hidratante e a seguir empurre-as.
- Usar substâncias oleosas para hidratar as unhas e protegê-las com base fortalecedora.
- Remover esmaltes com removedores ao invés de acetona que resseca as unhas.
- Identificar e tratar onicomicoses de forma tópica e sistêmica conforme orientação médica.



AUTO EXAME DOS PÉS

Examinar os pés diariamente, incluindo região plantar e entre os dedos.



SINAIS DE ALERTA

- Ao identificar: edema, vermelhidão, bolha, calo, lesão, dor ou diferença de temperatura entre os pés, procurar um serviço de saúde ou profissional especializado para atendimento.
- Em caso de micose interdigital (frieiras), higienizar os espaços interdigitais com solução antisséptica, secar, e passar antifúngico conforme orientação médica.
- Pacientes ou familiares, não devem remover calos. Procure profissionais qualificados para esse procedimento.
- **Para prevenção de recidivas de calo:** Usar calçados e palmilhas adequados que evitem pontos de pressão e atritos na área afetada e manter os pés sempre hidratados.

Quando perceber uma diferença de temperatura, de $\geq 2^{\circ}\text{C}$, entre os pés, acompanhado de edema e vermelhidão, **suspeito de neurartropatia de Charcot**, remova a carga (evite pisar com esse pé) e procure atendimento médico.

Referências bibliográficas:

E-book –SBD: Manual de Cuidados com os pés para pessoas com diabetes, 2ª edição-2021. Lucoveis, M.L.S.Guia de bolso para prevenção de ulcerações nos membros inferiores em pessoas com Diabetes Mellitus,2021. IWGDF. Diretrizes sobre prevenção e tratamento do pé diabético. Tradução Brasileira,2019. IDF Clinical Practice Recommendations on the Diabetic Foot, 2017.



LESÕES PRÉ-ULCERATIVAS

Acometem os pés de pessoas com diabetes e frequentemente passam despercebidas devido à presença de neuropatia. Quando não identificadas e tratadas precocemente, essas lesões trazem risco de complicações, como infecções e amputações.

CALO/ CALOSIDADE

Causas: hiperpressão plantar, fricção, deformidades e estresse mecânico.

Avaliar a calosidade cuidadosamente e classificar quantos ao grau:

Grau I - área com espessamento mínimo da camada de queratina;

Grau II - espessamento moderado da camada de queratina;

Grau III - espessamento exuberante da camada de queratina;

Grau IV - calosidade com hemorragia no subcutâneo;

Grau V - Calosidade com úlcera;

Grau VI - Calosidade com úlcera infectada.

Tratamento: De acordo com o grau identificado, realizar desbridamento, tratamento tópico da úlcera quando for o caso, offloading temporário e/ou definitivo para alívio e redistribuição das pressões. Tratar a infecção quando presente.





ONICOMICOSE

Causas: Neuropatia, trauma, doença vascular periférica, dentre outras.

Tratamento: Limpeza, Corte e remoção da massa fúngica sob a unha. Onicoabrasão da unha.



Terapia fotodinâmica. Quando possível realizar o diagnóstico clínico e laboratorial (micológico) para verificar a necessidade de tratamento oral associado ao tópico.

Orientar: Escovação das unhas com escova de cerdas macias e lubrificação com substância oleosa, diariamente. Uso de meia de algodão com troca diária e higiene do calçado (limpar e arejar diariamente).

ONICOCRIPTOSE

Causas: corte inadequado, calçados muito estreitos/apertados, excesso de suor nos pés, uso de alguns medicamentos, traumas, excesso de manipulação das unhas (remoção de cutículas).



Tratamento: Nos casos leves a moderados (dor, edema, hiperemia) realizar antissepsia e colocar anteparo de algodão para afastar a pele do contato com a unha. Em casos mais severos com presença de granuloma, realizar a remoção da espícula, eletroterapia (alta frequência e laser) e curativos com antimicrobiano. Aplicar a onicoórtese, se necessário.

Verificar a necessidade de uso de antibiótico associado à terapia tópica.



LESÃO INTERTRIGO (FRIEIRA)



Causas: Excesso de umidade entre os dedos, hiperidrose.

Tratamento: Realizar limpeza rigorosa entre os dedos e desbridamento superficial dos tecidos macerados.

Eletroterapia (alta frequência, laser de baixa intensidade). Se infectado encaminhar para avaliação e conduta médica.

Orientar: Higiene rigorosa com antissépticos. Manter os dedos limpos, secos e separados por gaze. Uso de meias de algodão com troca diária e higiene do calçado (limpar e arejar diariamente).

BOLHAS



Causas: Atrito, fricção, calçados apertados e atividades de alto impacto.

Tratamento: Bolha pequena e superficial em região sem atrito: manter intacta.

Bolha de grande dimensão localizada em região de atrito ou pressão, drenar a bolha e manter o teto.

Bolha com exsudato purulento ou sanguinolento ou suspeita de bolha profunda, drenar e desbridar o teto da bolha.

Nota: Esse procedimento deve ser realizado mediante protocolo elaborado pela instituição, considerando o quadro clínico do indivíduo como por exemplo, doença arterial periférica.

Referências bibliográficas:

COLAGIURI, S. et al. *The use of orthotic devices to correct plantar callus in people with diabetes* Diabetes Research and Clinical Practice. [s.l.: s.n.]. Lucoveis MLS, et al.. *Development and validation of a pocket guide for the prevention of diabetic foot ulcers*. Br J Nurs. 2021 Jun 24;30(12):S6-S15. doi: 10.12968/bjon.2021.30.12.S6. PMID: 34170740;





DESCARGA (OFFLOADING) PERMANENTE

Grau de Risco 0

Sem PSP /Sem DAP.



Calçados comuns
confortáveis, tipo tênis
ou papete.



Grau de Risco 1 e 2

PSP e/ou DAP
PSP e deformidade
DAP e deformidade



**Calçados do
tipo terapêutico**
que acomode as
deformidades, caixa
dos dedos alta, gáspea
complacente, colarinho
forrado, sem rebarbas
ou costuras internas,
fechamento em velcro
ou cadarço, solado semi
rígido do tipo rocker.



Grau de Risco 3


PSP e/ou DAP
História de úlcera
ou amputação



Calçados terapêuticos,
porém se grandes
deformidades ou
amputações, recomende
**calçados e palmilhas
customizados,**
feito sob medida
(individualizados),
órteses de silicone,
espaçadores de dedos e
próteses.



Pessoas com diabetes devem ser orientadas a não andar descalças. Os calçados devem ser ajustados aos pés, não apertados e nem largos, o comprimento deve ter de 1 a 2 cm além do maior dedo do pé, a largura interna coincide com a largura entre 1º e 5º metatarso, a altura (caixa dos dedos) o suficiente para não provocar trauma sobre as unhas ou dorso dos dedos. Solados devem ser antiderrapantes e semi flexíveis. Os calçados devem ser confortáveis, sem costuras, ou rebarbas internas. Comprar calçados no final do dia quando os pés estão mais edemaciados. Provar os calçados com meias, nos dois pés, e fazer pequenas caminhadas para avaliar se estão apertados ou largos.





DESCARGA (OFFLOADING) TEMPORÁRIA

Úlceras neuropáticas plantares sem infecção e sem isquemia ou infecção leve ou isquemia leve.



Idealmente:
DISPOSITIVOS NÃO REMOVÍVEIS: gesso de contato total, gesso de fibra de vidro (TCC-EZ) ou dispositivos removíveis tornados irremovíveis: lacrar/travar ou passar bandagem na bota imobilizadora.

Se não disponível no serviço ou não tolerado pelo paciente.

Úlceras neuropáticas plantares com infecção moderada ou grave ou isquemia moderada ou grave.



DISPOSITIVOS REMOVÍVEIS

Na altura dos joelhos (botas imobilizadoras tipo robofoot) ou na altura dos tornozelos (sandálias de cicatrização) com solado em cunha para ante pé, retro-pé ou solado reto. Evite meia-sandálias com ante-pé livre pois aumenta risco de queda e fratura de tornozelo. Associe aos dispositivos acima palmilhas, espumas feltradas, órteses de silicone, espaçadores de dedos, para intensificar a descarga.



Úlceras não plantares.



Dispositivos removíveis, modificações nos calçados, espaçadores ou órteses de dedos dos pés.



TCC-EZ



Bota c/lacre



Referências:

IWGDF – Guidelines on offloading foot ulcers in persons with diabetes.2023

Diretrizes SBD.2017-2018. Anexo 2 -calçados

Infocards. D.Foot –Descarga de peso- Tradução brasileira 2021.

Elaboração, distribuição e informações:

SBD - Sociedade Brasileira de Diabetes

Autores:

Geísa Maria Campos de Macedo, Nilce Botto Dompieri e
Maria do Livramento Saraiva Lucoveis

Projeto gráfico, diagramação e finalização:

Jun Ilyt Takata Normanha

Departamento de Diabetes, neuropatias e complicações nos pés

Geísa Maria Campos de Macedo, (Coordenadora), Ana Cristina
Ravazzani de Almeida - (vice Coordenadora),
Lucianne Righeti Monteiro Tannus,
Luiz Clemente Souza Pereira Rolim, Hermelinda Pedrosa

Colaboradores

Nilce Dompieri, Janaína Martins, Maria do Livramento Lucoveis

© 2026. Sociedade Brasileira de Diabetes - SBD. Todos os direitos reservados. A reprodução não autorizada desta publicação, no todo ou em parte, constitui violação dos direitos autorais (Lei nº 9.610/1998).

Informações e contatos: Telefone: (11) 3842 4931 / www.diabetes.org.br



SBD.Diabetes



socbrasdiabetes



@diabetessbd

Endereço:

Rua Afonso Braz, 579, Salas 72/74 • Vila Nova Conceição
CEP: 04511-0 11, São Paulo - SP